

## **Limfoscyntygrafia węzła wartowniczego w raku piersi z wykorzystaniem radiofarmaceutyku <sup>99m</sup>Tc-Nanoscan**

### **Informacja dla pacjenta**

1. W dniu badania pacjent **nie musi być na czczo**.
2. Badania **nie wykonuje się u kobiet w ciąży** - przed skierowaniem na badanie należy wykluczyć ciążę.
3. Pacjent zgłasza się do rejestracji dnia ..... o godzinie .....na badanie z dowodem osobistym.
4. Po zarejestrowaniu pacjent udaje się do poczekalni, gdzie oczekuje na wezwanie przez pielęgniarkę.
5. Następnie pacjent otrzymuje dożylnie radioznacznik wokół otoczki brodawki sutkowej/blizny pooperacyjnej (4 wstrzyknięcia) w gabinecie zabiegowym oraz jest informowany, o której godzinie będzie miał wykonane badanie, orientacyjny czas trwania badania to ok. 30 minut, a czas oczekiwania na badanie to ok. 1,5 godz. (czas niezbędny na prawidłowe rozmieszczenie się radioznacznika).
6. **Bezpieczeństwo:** po podaniu radiofarmaceutyku **pacjent jest źródłem promieniowania jonizującego**. Po wstrzyknięciu radioizotopu w dniu badania pacjent powinien unikać kontaktu z kobietami w ciąży i dziećmi do 16 roku życia.
7. W przypadku wykonania wcześniej badań obrazowych (USG, TK, MRI) pacjent proszony jest o dostarczenie wyników w/w badań / płyt CD.
8. **Wynik wydawany jest w rejestracji Zakładu Medycyny Nuklearnej WIM po 7 dniach.**