

Scyntygrafia kanalików łzowych z wykorzystaniem radiofarmaceutyku $^{99m}\text{TcO}_4^-$

Informacja dla pacjenta

1. W dniu badania pacjent **nie musi być na czczo.**
2. Badania **nie wykonuje się u kobiet w ciąży** - przed skierowaniem na badanie należy wykluczyć ciążę.
3. Pacjent zgłasza się do rejestracji dnia o godzinie na badanie z dowodem osobistym.
4. Po zarejestrowaniu pacjent oczekuje w poczekalni na wezwanie przez pielęgniarkę.
5. Następnie pacjent przechodzi do pracowni, radioznacznik podawany jest do worka spojówkowego, wykonywane jest badanie diagnostyczne, które trwa około 10 minut.
6. Po wywołaniu pacjent przechodzi do pomieszczenia z gamma kamerą, radioznacznik zostaje podany do worka spojówkowego. Następnie wykonywane jest badanie z użyciem gamma kamery, które trwa ok. 10 min.
7. **Bezpieczeństwo:** po podaniu radiofarmaceutyku **pacjent jest źródłem promieniowania jonizującego**, po badaniu pacjent powinien unikać kontaktu z kobietami w ciąży i dziećmi do 16 roku życia.
8. Pacjenci, którzy **będą korzystać z transportu lotniczego** po wykonaniu badania muszą posiadać zaświadczenie o tym, że odbyli badanie z podaniem radioizotopu.
Takie zaświadczenie mogą uzyskać w rejestracji Zakładu Medycyny Nuklearnej WIM.
9. **Wynik badania wydawany jest w rejestracji Zakładu Medycyny Nuklearnej WIM po 7 dniach w godzinach 7.30-14.00.**