

Scyntygrafia oczodołów z wykorzystaniem radiofarmaceutyku ^{99m}Tc-DTPA

Informacja dla pacjenta

1. W dniu badania pacjent **nie musi być na czczo**.
2. Badania **nie wykonuje się u kobiet w ciąży** - przed skierowaniem na badanie należy wykluczyć ciążę.
3. Pacjent zgłasza się do rejestracji dnia o godzinie na badanie z dowodem osobistym.
4. Po zarejestrowaniu pacjent udaje się do poczekalni, gdzie oczekuje na wezwanie przez pielęgniarkę.
5. Następnie pacjent otrzymuje dożylnie radiofarmaceutyk w gabinecie zabiegowym. Zazwyczaj badanie rozpoczyna się po około 20 minutach od podania, jest to czas niezbędny na prawidłowe rozmieszczenie radiofarmaceutyku. Badanie trwa około 20 minut.
6. **Bezpieczeństwo:** po podaniu radiofarmaceutyku **pacjent jest źródłem promieniowania jonizującego**. Po wstrzyknięciu radioizotopu w dniu badania pacjent powinien unikać kontaktu z kobietami w ciąży i dziećmi do 16 roku życia.
7. Pacjenci, którzy **będą korzystać z transportu lotniczego** po wykonaniu badania muszą posiadać zaświadczenie o tym, że odbyli badanie z podaniem radioizotopu. Takie zaświadczenie mogą uzyskać w rejestracji Zakładu Medycyny Nuklearnej WIM.
8. W przypadku wykonania wcześniej badań obrazowych (USG, MRI) pacjent proszony jest o dostarczenie wyników w/w badań / płyt CD.
9. **Wynik badania wydawany jest w rejestracji Zakładu Medycyny Nuklearnej WIM po 7 dniach w godzinach 7.30-14.00.**