

## Scyntygrafia perfuzyjna i wentylacyjna płuc z wykorzystaniem radiofarmaceutyku <sup>99m</sup>Tc-MAA i Technegasu

### Informacja dla pacjenta

1. W dniu badania pacjent **nie musi być na czczo**.
2. Badanie **u kobiet w ciąży wykonuje się jedynie w przypadku zagrożenia życia**- przed skierowaniem na badanie należy wykluczyć ciążę,
3. Pacjent zgłasza się do rejestracji dnia ..... o godzinie .....na badanie z dowodem osobistym,
4. Po zarejestrowaniu pacjent udaje się do poczekalni, gdzie oczekuje na wezwanie przez pielęgniarkę.
5. Badanie odbywa się w pozycji leżącej pod gamma kamerą. Po dożylnym podaniu radioznacznika następuje faza obrazowania, która trwa zazwyczaj około 15 minut.
6. Po badaniu pacjent powinien wypić od 1 do 1,5 litra płynu, najlepiej wody.
7. Specyfika procesu diagnostycznego wymaga czasem wykonania badania wentylacyjnego płuc, gdzie pacjent otrzymuje wziewnie radioznacznik. O potrzebie wykonania tej części badania decyduje lekarz po zapoznaniu się z badaniem perfuzyjnym płuc. **O konieczności i terminie wykonania części wentylacyjnej badania zostaną Państwo poinformowani telefonicznie przez Rejestrację w dniu badania lub kolejnego dnia.**
8. **Bezpieczeństwo:** po podaniu radiofarmaceutyku **pacjent jest źródłem promieniowania jonizującego**. Po wstrzyknięciu radioizotopu w dniu badania pacjent powinien unikać kontaktu z kobietami w ciąży i dziećmi do 16 roku życia.
9. Pacjenci, którzy **będą korzystać z transportu lotniczego** po wykonaniu badania muszą posiadać zaświadczenie o tym, że odbyli badanie z podaniem radioizotopu.  
Takie zaświadczenie mogą uzyskać w rejestracji Zakładu Medycyny Nuklearnej WIM.
10. W przypadku wykonania wcześniej innych badań obrazowych (scyntygrafia, TK, MRI, PET-CT) pacjenci proszeni są o dostarczenie wyników w/w badań / płyt CD.
11. **Wynik badania wydawany jest w rejestracji Zakładu Medycyny Nuklearnej WIM po 7 dniach w godzinach 7.30-14.00.**