

Scyntygrafia tarczycy z wykorzystaniem radiofarmaceutyku ¹³¹I

Informacja dla pacjenta

1. Badanie wykonuje się przez dwa dni, w pierwszym dniu badania pacjent musi być na czczo, należy odstawić leki hamujące czynność tarczycy 5-7 dni przed badaniem (decyzję podejmuje lekarz kierujący na badanie).

2. Badania **nie wykonuje się u kobiet w ciąży**-przed skierowaniem na badanie należy wykluczyć ciążę.

W DNIU PODANIA KAPSUŁKI

3. Pacjent zgłasza się do rejestracji dnia o godzinie na badanie z dowodem osobistym.
4. Po zarejestrowaniu pacjent udaje się do poczekalni, gdzie oczekuje na wezwanie przez personel.
5. Pacjent otrzymuje doustnie kapsułkę z jodem promieniotwórczym, a następnie udaje się do domu.
Po połknięciu kapsułki należy wstrzymać się godzinę od spożywania posiłków, należy wypić od 1 do 1,5 litra wody.

W DNIU OBRAZOWANIA

6. Następnego dnia pacjent zgłasza się do rejestracji (**pacjent nie musi być na czczo**), po zarejestrowaniu udaje się do poczekalni, gdzie oczekuje na wezwanie przez personel, następnie elektroradiolog wykonuje obrazowanie, które trwa około 10 minut.

7. WAZNE INFORMACJE

Po podaniu radiofarmaceutyku **pacjent jest źródłem promieniowania jonizującego**. Po podaniu radioizotopu w dniu badania oraz dzień po badaniu pacjent powinien unikać kontaktu z kobietami w ciąży i dziećmi do 16 roku życia.

8. Pacjenci, którzy **będą korzystać z transportu lotniczego** po wykonaniu badania muszą posiadać zaświadczenie o tym, że odbyli badanie z podaniem radioizotopu. Takie zaświadczenie mogą uzyskać w rejestracji Zakładu Medycyny Nuklearnej WIM.
9. W przypadku wykonania wcześniej badań obrazowych (USG tarczycy, scyntygrafii, TK, MRI, PET-CT) pacjenci proszeni są o dostarczenie wyników w/w badań / płyt CD.
10. Wynik badania wydawany jest w rejestracji Zakładu Medycyny Nuklearnej WIM po 7 dniach w godzinach 7.30-14.00.