

Scyntygrafia tarczycy z wykorzystaniem radioizotopu Tc⁹⁹

Informacja dla pacjenta

1. **W dniu badania pacjent nie musi być na czczo.** Należy odstawić leki hamujące czynność tarczycy 5-7 dni przed badaniem (decyzję podejmuje lekarz kierujący na badanie).
2. Badania **nie wykonuje się u kobiet w ciąży**-przed skierowaniem na badanie należy wykluczyć ciążę.
3. Pacjent zgłasza się do rejestracji dnia o godzinie na badanie z dowodem osobistym.
4. Po zarejestrowaniu pacjent udaje się do poczekalni, gdzie oczekuje na wezwanie przez personel.
5. Pacjent otrzymuje dożylnie radiofarmaceutyk w gabinecie zabiegowym. Badanie wykonuje się po około 20-30 minut od podania.
6. Po wykonaniu badania pacjent powinien wypić od jednego do półtora litra płynu, najlepiej wody.
7. **Bezpieczeństwo:** po podaniu radiofarmaceutyku **pacjent jest źródłem promieniowania jonizującego.** Po wstrzyknięciu radioizotopu w dniu badania pacjent powinien unikać kontaktu z kobietami w ciąży i dziećmi do 16 roku życia.
8. Pacjenci, którzy **będą korzystać z transportu lotniczego** po wykonaniu badania muszą posiadać zaświadczenie o tym, że odbyli badanie z podaniem radioizotopu. Takie zaświadczenie mogą uzyskać w rejestracji Zakładu Medycyny Nuklearnej WIM.
9. W przypadku wykonania wcześniej badań obrazowych (USG, scyntygrafii, TK, MRI, PET-CT) pacjenci proszeni są o dostarczenie wyników w/w badań / płyt CD.
10. **Wynik badania wydawany jest w rejestracji Zakładu Medycyny Nuklearnej WIM po 7 dniach w godzinach 7.30-14.00.**