

Scyntygrafia uchyłka Meckela
z wykorzystaniem radiofarmaceutyku $\text{Na}^{99\text{m}}\text{TcO}_4$ (nadtechnecjan sodu)

Informacja dla pacjenta

1. **W dniu badania pacjent pozostaje na czczo na 12 godz. przed badaniem**, należy odstawić leki hamujące czynność tarczycy 2 dni przed badaniem (decyzję podejmuje lekarz kierujący na badanie), bezpośrednio przed badaniem pacjent powinien się wypróżnić, należy upewnić się, czy pacjent nie miał badania radiograficznego z barem na 48 godzin przed scyntyografią.
1. Badania **nie wykonuje się u kobiet w ciąży** - przed skierowaniem na badanie należy wykluczyć ciążę.
2. Pacjent zgłasza się do rejestracji dnia o godzinie na badanie z dowodem osobistym.
3. Po zarejestrowaniu pacjent udaje się do poczekalni, gdzie oczekuje na wezwanie przez personel.
4. Następnie pacjent uклада się w pozycji leżącej pod gamma kamerą i otrzymuje dożylnie radiofarmaceutyk. Obrazowanie rozpoczyna się w momencie podania radioznacznika i trwa od 1 do 1,5 godziny.
5. Po wykonaniu badania pacjent powinien wypić od jednego do półtora litra płynu, najlepiej wody.
6. **Bezpieczeństwo:** po podaniu radiofarmaceutyku **pacjent jest źródłem promieniowania jonizującego**. Po wstrzyknięciu radioizotopu w dniu badania pacjent powinien unikać kontaktu z kobietami w ciąży i dziećmi do 16 roku życia.
7. Pacjenci, którzy **będą korzystać z transportu lotniczego** po wykonaniu badania muszą posiadać zaświadczenie o tym, że odbyli badanie z podaniem radioizotopu. Takie zaświadczenie mogą uzyskać w rejestracji Zakładu Medycyny Nuklearnej WIM.
8. W przypadku wykonania wcześniej badań obrazowych (USG, scyntygrafii, TK, MRI, PET-CT) pacjenci proszeni są o dostarczenie wyników w/w badań / płyt CD.
9. **Wynik badania wydawany jest w rejestracji Zakładu Medycyny Nuklearnej WIM po 7 dniach w godzinach 7.30 -14.00.**